

### EXUDADO URETRAL

(La recogida de este tipo de muestras debe ser preferiblemente realizada por profesionales)

#### **Exudado uretral.**

##### **Material:**

Se deben usar **torundas finas** con varilla de alambre, de alginato cálcico o dacrón y con medio de transporte tipo Stuart-Amies.

##### **Técnica:**

Para obtener un mejor rendimiento, el paciente **no debe haber orinado en las 2 horas previas** a la realización de la toma de la muestra.

Se debe introducir la torunda suavemente por la **uretra unos 2 cm realizando un movimiento de rotación**, para posteriormente extraerla e introducirla en el medio de transporte. Si existe secreción abundante, puede recogerse con la torunda, incluso "exprimiendo" la uretra

Si existe sospecha de paciente portador faríngeo de gonococo se puede solicitar en paralelo el cultivo del exudado faríngeo.

##### **Conservación y transporte**

La muestra se trasladará lo más rápidamente posible al laboratorio después de su obtención. El límite para aceptar la muestra en el laboratorio es un máximo de **24 h a temperatura ambiente**

#### **Horario de recogida de muestras: Lunes a viernes de 10-13h y de 16-20h**

Rellene con los datos del paciente la casilla sombreada y el exterior de la muestra.

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**APELLIDOS:** \_\_\_\_\_

Número de HC:

Prueba solicitada: **EXUDADO URETRAL** (Cód 4.10)

Fecha de recepción:

Número de entrada: