

ESTUDIO DE PORTADOR DE *S. AGALACTIAE* EN GESTANTES

Material necesario: 2 torundas de alginato cálcico o de dacrón con medio de transporte tipo Amies/stuart. (Solicitarlas en centro de salud, farmacia o en nuestro centro)

Rotular las torundas con sus datos (Nombre, apellidos, semana de gestación) y tipo de muestra (Vaginal o rectal)

Exudado vaginal

Se recomienda un lavado de la zona genital con agua y jabón, secar con una gasa limpia. Separar los labios mayores, introducir la torunda de algodón unos 3 cm y rotarla 4-5 veces en el interior de la vagina. Retirar la torunda e introducirla en el recipiente con una base gelatinosa (medio de transporte). Para el estado de portador de *Streptococcus agalactiae* se debe recoger en paralelo un exudado vaginal y un exudado rectal.

Exudado rectal.

Introducir una torunda a través del esfínter anal unos 3 cm y rotar contra las criptas rectales durante unos segundos. Se ha de evitar el contacto con materia fecal, lo que invalidaría la muestra, obligando a una nueva toma.

Conservar ambas muestras a temperatura ambiente hasta su entrega en el laboratorio lo antes posible. Pasadas 24 horas habría que recoger una nueva muestra.

Horario de recogida de muestras: Lunes a viernes de 10-13h y de 16-20h

Rellene la casilla sombreada con sus datos.

NOMBRE: _____

APELLIDOS: _____

Número de HC:

Prueba solicitada: **ESTUDIO DE PORTADOR DE *S. AGALACTIAE***
(Código 4.3)

Fecha de recepción:

Número de entrada: