

### Exudado Orofaringeo (Faringoamigdalar / oral)

**Material:**

La muestra se debe obtener con **torundas o hisopos** de Dacron o alginato cálcico en un tubo con **medio de transporte** tipo Amies-Stuart.

**Conservación y transporte**

La muestra se trasladará lo más rápidamente posible al laboratorio después de su obtención. El límite para aceptar la muestra en el laboratorio es un máximo de **24 h a temperatura ambiente**

### Faringoamigdalar

El cultivo del exudado faringoamigdalar es la técnica de referencia para realizar el diagnóstico etiológico de faringitis. La muestra debe obtenerse tan pronto como sea posible tras la aparición de los síntomas y antes de instaurar la terapia antibiótica.

**Técnica:**

Con la ayuda de un depresor se inmoviliza la lengua, y se realiza la toma del área amigdalar y faringe posterior, así como de cualquier zona inflamada o ulcerada. Es fundamental evitar rozar la torunda con la úvula, la mucosa bucal, los labios o con la lengua, tanto antes como después de la toma.

### Exudado Oral

El cultivo del exudado oral es de elección para realizar el diagnóstico etiológico de candidiasis y de infección de úlceras en mucosa oral.

**Técnica:**

Con la torunda se realiza la toma de muestra frotando la zona inflamada o ulcerada.

### **Horario de recogida de muestras: Lunes a viernes de 10-13h y de 16-20h**

Rellene con los datos del paciente la casilla sombreada y el exterior de la muestra.

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**APELLIDOS:** \_\_\_\_\_

Número de HC:

**Prueba solicitada:** Faríngeo  / Candidiasis  / Úlcera  (Cód 4.6)

Fecha de recepción:

Número de entrada: